

Que faut-il savoir sur Xarelto® ?

- ◆ Xarelto® fluidifie le sang, ce qui vous protège de la formation de caillots sanguins dangereux pour la santé.
- ◆ Xarelto® doit être pris exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. N'oubliez jamais de prendre votre traitement afin d'assurer une protection optimale contre les caillots sanguins.
- ◆ Vous ne devez jamais arrêter de prendre Xarelto® sans en parler d'abord à votre médecin, car le risque de formation de caillots sanguins peut être augmenté.

- ◆ Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, avant de prendre Xarelto®.
- ◆ Informez votre médecin que vous êtes traité par Xarelto® avant toute intervention chirurgicale ou tout geste invasif.

Quand dois-je demander conseil à mon médecin ou à mon pharmacien ?

Lors de la prise d'un médicament fluidifiant le sang comme Xarelto®, il est important de connaître les éventuels effets indésirables. Les saignements sont l'effet indésirable

le plus fréquent. Si vous présentez un risque de saignement inhabituel, ne commencez pas à prendre Xarelto® sans en avoir parlé d'abord avec votre médecin. Prévenez immédiatement votre professionnel de santé si vous présentez des signes ou des symptômes de saignements tels que :

- ◆ douleurs
- ◆ gonflement ou sensations d'inconfort
- ◆ maux de tête, sensations vertigineuses ou faiblesse
- ◆ ecchymoses/bleus inhabituel(le)s, saignements du nez, saignements des gencives, ou saignement d'une plaie difficile à stopper
- ◆ menstruations (règles) ou saignements vaginaux plus abondants que d'ordinaire

- ◆ sang dans les urines pouvant les colorer en rose ou marron, selles rouges ou noires
- ◆ si vous crachez du sang, ou vomissez du sang ou des substances ressemblant à du marc de café

Comment dois-je prendre Xarelto® ?

- ◆ Pour garantir une protection optimale, Xarelto®
 - 2,5 mg peut être pris au cours ou en dehors des repas,
 - 10 mg peut être pris au cours ou en dehors des repas,
 - 15 mg doit être pris au cours des repas,
 - 20 mg doit être pris au cours des repas.

Carte de Surveillance du Patient



Xarelto® 2,5 mg
Xarelto® 10 mg
Xarelto® 15 mg
Xarelto® 20 mg

- ◆ Gardez toujours cette carte sur vous
- ◆ Montrez cette carte à tout médecin ou dentiste que vous consultez avant de commencer un traitement

**Je suis sous traitement anticoagulant par Xarelto®
(rivaroxaban).**

Nom :

Autres médicaments /Pathologies :

Adresse :

Date de naissance :

Poids :

**En cas d'urgence,
veuillez prévenir :**

Nom du médecin :

Téléphone du médecin :

Cachet du médecin :

Veuillez aussi prévenir :

Nom :

Téléphone :

Lien avec le patient :

**Information
à destination
des professionnels
de santé :**

- ◆ Les valeurs de l'INR ne doivent pas être utilisées car elles ne représentent pas une valeur fiable de la mesure de l'activité anticoagulante de Xarelto®.

