



**Pictogramme "Femmes enceintes" et message associé : liste des spécialités commercialisées de la division  
Pharmaceuticals et dont Bayer HealthCare SAS est exploitant et/ou représentant local (conformément au Décret  
2017-550 du 14 avril 2017 relatif à l'apposition d'un pictogramme sur le conditionnement  
extérieur de certains médicaments ou produits)**

*Pour plus d'informations, veuillez-vous reporter au RCP et à la notice du produit.*

Nom de la spécialité	Pictogramme	Message associé
ADALATE 10 mg, capsule	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
ADALATE 20 mg L.P., comprimé à libération prolongée	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
ANDROCUR 100 mg, comprimé sécable	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte
ANDROCUR 50 mg, comprimé sécable	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte
ANDROTARDYL 250 mg/1 ml, solution injectable intramusculaire	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ANGELIQ 1 mg/2 mg, comprimé pelliculé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ASPIRINE PROTECT 100 mg, comprimé gastro-résistant	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
ASPIRINE PROTECT 300 mg, comprimé gastro-résistant	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
BAYPRESS 10 mg, comprimé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
BAYPRESS 20 mg, comprimé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
BELANETTE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
BETAFERON 250 microgrammes/ml, poudre et solvant pour solution injectable	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer sans contraception efficace. Si vous débutez une grossesse alors que vous utilisez Betaferon, arrêtez le traitement et contactez immédiatement votre médecin. Il décidera avec vous si vous devez ou non continuer le traitement. Le traitement par Betaferon ne doit pas être débuté si vous êtes enceinte.
CHRONADALATE L.P. 30 mg, comprimé osmotique pelliculé à libération prolongée	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
CIFLOX 200 mg/100 ml, solution pour perfusion (IV)	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
CIFLOX 250 mg, comprimé pelliculé sécable	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
CIFLOX 500 mg, comprimé pelliculé sécable	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
CIFLOX 500 mg/5 ml, granulés et solvant pour suspension buvable	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
CLIMENE, comprimé enrobé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
CONVULINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
DIANE 35 microgrammes, comprimé enrobé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
EYLEA 40 mg/ml, solution injectable en flacon	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
GADOVIST 1,0 mmol/ml, solution injectable	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
GADOVIST 1,0 mmol/ml, solution injectable en seringue préremplie	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
GASTROGRAFINE 370 mg d'iode/mL, solution buvable ou rectale	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter de 14 semaines d'aménorrhée sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
ILOMEDINE 0,1 mg/1 ml, solution injectable pour perfusion	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte
IZILOX 400 mg, comprimé pelliculé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
IZILOX 400 mg/250 ml, solution pour perfusion	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
JASMINE 0,03 mg/3 mg, comprimé pelliculé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
JASMINELLE 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
JASMINELLECONTINU 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte



**Pictogramme "Femmes enceintes" et message associé : listing des spécialités commercialisées de la division Bayer Pharmaceuticals et dont Bayer HealthCare est exploitant et/ou représentant local (conformément au Décret no 2017-550 du 14 avril 2017 relatif à l'apposition d'un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments ou produits)**

Nom de la spécialité	Niveau du pictogramme	Libellé du pictogramme
JAYDESS 13,5 mg, système de diffusion intra-utérin	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
KYLEENA 19,5 mg, système de diffusion intra-utérin (commercialisation prévue en 2018)	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
MAGNEVIST, solution injectable (IV)	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
MAGNEVIST, solution injectable en seringue préremplie (IV)	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
MIRENA 52 mg (20 microgrammes/24 heures), dispositif intra-utérin	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
NALADOR 500 microgrammes, lyophilisat pour usage parentéral	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte en dehors de ses indications
NEBIDO 1000 mg/4 ml, solution injectable	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
NEXAVAR 200 mg, comprimé pelliculé	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
NIMOTOP 10 mg/50 ml, solution injectable pour perfusion	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
NIMOTOP 30 mg, comprimé pelliculé	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
NOCTAMIDE 1 mg, comprimé sécable	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
NOCTAMIDE 2 mg, comprimé sécable	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
PRITOR 20 mg , comprimé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
PRITOR 40 mg , comprimé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
PRITOR 80 mg , comprimé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
PRITORPLUS 40 mg/12,5 mg, comprimé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
PRITORPLUS 80 mg/12,5 mg, comprimé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
PRITORPLUS 80 mg/25 mg, comprimé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte
RADIOSELECTAN URINAIRE 30 POUR CENT (146 mg d'iode/ml), solution injectable	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter de 14 semaines d'aménorrhée sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
STIVARGA 40 mg, comprimé pelliculé	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
ULTRAVIST 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter de 14 semaines d'aménorrhée sauf en l'absence d'alternative thérapeutique Ne pas utiliser chez la femme enceinte dans les hysterosalpingographies
ULTRAVIST 300 (300 mg d'iode/ml), solution injectable en seringue préremplie pour injecteur automatique	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter de 14 semaines d'aménorrhée sauf en l'absence d'alternative thérapeutique Ne pas utiliser chez la femme enceinte dans les hysterosalpingographies
ULTRAVIST 370 (370 mg d'iode/ml), solution injectable	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter de 14 semaines d'aménorrhée, sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
ULTRAVIST 370 (370 mg d'iode/ml), solution injectable en seringue préremplie pour injecteur automatique	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte à compter de 14 semaines d'aménorrhée sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
UNIFLOX, comprimé pelliculé sécable	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
VENTAVIS 10µg/ml, solution pour inhalation par nébuliseur	"DANGER"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = DANGER</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique
XARELTO 10 mg, comprimé pelliculé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte
XARELTO 15 mg, comprimé pelliculé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte
XARELTO 20 mg, comprimé pelliculé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace ; et chez la femme enceinte
YAZ 0,02 mg/3 mg, comprimé pelliculé	"INTERDIT"	<b>CE MEDICAMENT + GROSSESSE = INTERDIT</b> Ne pas utiliser chez la femme enceinte